

8a

# « Mon enfant a les yeux rouges et/ou collés »

## Causes et signes à rechercher



### Affections pouvant causer un œil rouge chez l'enfant

Chez tous les enfants	Causes supplémentaires : nourrisson	Causes supplémentaires : jeune enfant
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Conjonctivite virale ou bactérienne</li> <li>• Ulcère cornéen</li> <li>• Remèdes oculaires traditionnels</li> <li>• Corps étranger</li> <li>• Traumatisme</li> <li>• Allergie oculaire</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ophtalmie du nouveau-né : kératoconjonctivite infectieuse acquise durant l'accouchement, qui se manifeste dans les 28 jours suivant la naissance. Peut être due à une infection à gonocoque (grave et cécitante), à Chlamydia ou à une autre infection bactérienne</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Conjonctivite allergique: généralement bilatérale et intermittente</li> <li>• Limbo-conjonctivite endémique des tropiques (LCET): allergie grave, saisonnière ou continue, généralement bilatérale</li> <li>• Trachome</li> </ul>

### Questions à poser aux parents

- Quel âge a votre enfant ? S'il a moins de 28 jours, suspectez une ophtalmie du nouveau-né.
- Quand sont apparues la rougeur oculaire et les sécrétions collantes ?
- Y a-t-il des antécédents de traumatisme (oculaire ou autre) ? Décrivez exactement ce qui s'est passé.
- Avez-vous utilisé des remèdes oculaires traditionnels ? Ceux-ci peuvent entraîner différents problèmes.
- D'autres personnes présentent-elles le même problème dans votre famille ou votre communauté ? Si oui, suspectez une conjonctivite virale ou un trachome.

### Questions supplémentaires : nourrissons

- Est-ce que le père ou la mère présente une infection urogénitale, un écoulement ou un ulcère génital ?

### Questions supplémentaires : jeunes enfants

- L'enfant présente-t-il d'autres problèmes, de type démangeaisons cutanées ou respiration sifflante? Si oui, suspectez une conjonctivite allergique ou une LCET.

### Signes à rechercher (voir aussi diagnostic différentiel au verso de cette fiche)

- L'écoulement est-il clair ou bien jaune et épais ? Un écoulement jaune et épais indique généralement une infection bactérienne, y compris à gonocoque.
- Y a-t-il présence d'un ulcère cornéen ? Il sera plus facile de le visualiser en lumière bleue après instillation d'un collyre à la fluorescéine.
- Examinez les yeux avec soin pour détecter tout signe de traumatisme oculaire. Éversez les paupières pour rechercher un éventuel corps étranger.

### Questions supplémentaires : nourrissons

- Lorsque l'enfant a moins de 28 jours, si les paupières sont œdémateuses et l'écoulement jaune et épais, il s'agit très vraisemblablement d'une ophtalmie du nouveau-né.

### Questions supplémentaires : jeunes enfants

- Éversez les paupières supérieures. Un aspect « en pavage » est le signe d'une LCET. La présence de follicules et/ou d'une inflammation très importante sur la face interne des paupières supérieures indique généralement un trachome.
- La présence de démangeaisons, de sécrétions claires et de rougeur oculaire peut être le signe d'une conjonctivite allergique ou d'une LCET.
- S'il n'y a pas d'ulcère et si les yeux sont rouges et larmoyants, il peut s'agir d'une conjonctivite bactérienne ou virale, en particulier en cas de sécrétions collantes.

### Ces affections peuvent entraîner une rougeur oculaire et/ou des sécrétions collantes :



Conjonctivite bactérienne



Ophtalmie du nouveau-né (gonocoque)



Limbo-conjonctivite endémique des tropiques



Trachome

# « Mon enfant a les yeux rouges et/ou collés » Diagnostic différentiel de l'œil rouge chez l'enfant

	Ophtalmie du nouveau-né	Conjonctivite bactérienne	Conjonctivite virale	Conjonctivite allergique	LCET	Trachome	Ulcère cornéen	Corps étranger : corréen ou sous-palpébral	Remedes oculaires traditionnels	Traumatisme contusif	Traumatisme perforant
<b>Âge</b>	Moins de 28 jours	Tout âge	Tout âge	Écoliers du primaire les plus touchés	Écoliers du primaire les plus touchés	Écoliers du primaire les plus touchés	Tout âge	Tout âge ; garçons plus que filles	Tout âge	Tout âge ; garçons plus que filles	Tout âge ; garçons plus que filles
<b>Affection uni- ou bilatérale</b>	Bilatérale en général	Bilatérale en général	Bilatérale en général	Bilatérale en général	Bilatérale en général	Bilatéral en général	Un œil atteint, mais parfois deux	Un œil atteint en général	Les deux yeux peuvent être atteints	Un œil atteint en général	Un œil atteint en général
<b>Paupières</b>	Très œdémateuses et rouges	Léger œdème	Pas d'œdème	Épisodes œdémateux	Parfois épaissies	Parfois épaissies	Normales en général	Normales en général	Parfois atteinte palpébrale	Parfois ecchymose palpébrale	Normales en général
<b>Vision</b>	Trop jeune pour tester	Normale	Normale	Normale	Normale ou réduite	Normale	En général réduite dans œil/yeux affecté(s)	Normale ou réduite	Souvent réduite	Réduite	Réduite
<b>Douleur oculaire</b>	Trop jeune pour répondre	Œil normal ou sensation de grains de sable	Œil normal ou sensation de grains de sable	Démangeaisons/ sensation de grains de sable	Démangeaisons/ sensation de grains de sable	Aucune douleur / léger inconfort	Œil très douloureux en général	Œil douloureux en général	Œil parfois très douloureux	Œil très douloureux en général	Œil très douloureux en général
<b>Sécrétions</b>	Jaunes et épaisses	Jaunes et épaisses	Clares ; paupières collées au réveil	Clares et filamenteuses	Clares et filamenteuses	Clares	Clares	Clares	Peuvent être claires ou jaunes et épaisses	Larmoiement	Clares. Présence éventuelle de sang
<b>Conjonctive</b>	Très enflammée quand infection à gonocoque	Rougeur généralisée (variable)	Rougeur généralisée (variable)	Parfois très œdémateuse. Rougeur très légère	Parfois présence de grains au niveau du limbe ; conjonctive parfois rouge avec décolorations brunes	Inflammation légère	Rougeur plus marquée autour de la cornée	Parfois enflammée	Souvent enflammée	Parfois hémorragie sous-conjonctivale	Parfois présence de lacerations
<b>Cornée</b>	Un ulcère peut très vite se développer quand infection à gonocoque	Normale	Normale	Normale	Normale, ou dans les cas graves présence d'une plaque ronde dans la moitié supérieure de la cornée	Opacité due au frottement des cils retournés	Tache gris-blanc (colorée par la fluorescéine)	Corps étranger sur la cornée ou sous la paupière supérieure	Parfois normale, parfois ulcération très nette	Normale	Parfois lacération coméenne avec hernie de l'iris
<b>Chambre antérieure (CA)</b>	Ne peut être examinée	Normale	Normale	Normale	Normale	Normale	Parfois présence d'un niveau liquide blanchâtre dans la CA (hypopyon)	Normale	Examen parfois impossible	Parfois présence de sang dans la CA (hyphéma)	Parfois CA peu profonde
<b>Pupille</b>	Ronde et réagit à la lumière	Ronde et réagit à la lumière	Ronde et réagit à la lumière	Ronde et réagit à la lumière	Ronde et réagit à la lumière	Ronde et réagit à la lumière	Parfois irrégulière	Ronde et réagit à la lumière	Examen parfois impossible	Parfois dilatée	Parfois pupille déformée et hernie du tissu uvéal
<b>Photophobie</b>	Ne peut être testée	Aucune/Légère	Légère	Légère	Léger/Très nette	Aucune/Légère	Importante	Importante	Importante	Importante	Importante
<b>Signes diagnostiques utiles</b>	Écoulement jaune et épais chez un enfant âgé de moins de 28 jours	Écoulement jaune et épais bilatéral avec cornée transparente, pupille normale et vision normale	Écoulement clair bilatéral avec cornée transparente, pupille normale et vision normale. Autres membres de la famille également affectés	Présence d'autres signes d'allergie, tels que démangeaisons cutanées ou respiration sifflante	Aspect en pavage quand on évase la paupière supérieure	Follicules et/ou inflammation importante sur la face interne des paupières supérieures	Tache ou marque blanche sur la cornée, qui peut être colorée par la fluorescéine	Antécédents de jeux en plein air	Présentation atypique. Souvent antécédents de conjonctivite ou rougeole. Les parents n'admettent pas toujours l'utilisation de remèdes traditionnels	Antécédents de traumatisme. Hémorragie sous-conjonctivale avec présence de sang dans la CA	Antécédents de traumatisme causé par un objet tranchant